

KRZTUSIEC

Bordetella pertussis



**KOKLUSZ,
100-DNIOWY KASZEL**

**PAŁECZKA KRZTUŚCA I JEJ TOKSYNY
NAMNAŻA SIĘ W DROGACH
ODDECHOWYCH**



OBJAWY

- ✓ **Kaszel** napadowy trwający co najmniej 2 tygodnie
- ✓ Najostrzejszą formą charakterystycznego kaszlu jest tzw. "**pianie**"
- ✓ U niemowląt może powodować **bezdech**
- ✓ Typowy krztusiec 6 – 10 tyg.



PROFILAKTYKA

- ✓ **NIEMOWLĘTA I MAŁE DZIECI**
szczepionki
DTP / DTaP / "5w1" / "6w1"
- ✓ **MŁODZIEŻ I DOROŚLI**
dawki przypominające
szczepionki Tdap
- ✓ **KOBIETY W CIĄŻY**
szczepionka
Tdap

SZCZEPIENIE JEST WAŻNE 10 LAT, PÓŹNIEJ NALEŻY JE POWTÓRZYĆ

NIEMOWLĘTA I MAŁE DZIECI

- ZAPALENIE PŁUC
- DRGAWKI
- ENCEFALOPATIA
- ZGON

STARSZE DZIECI I OSOBY DOROŚLE

- OMDLENIA
- ZABURZENIA SNU
- ZŁAMANIA ŻEBER
- NIETRZYMANIE MOCZU I STOLCA

POWIKŁANIA