

POLIO



Poliomyelitis

**CHOROBA
HEINEGO-MEDINA**

**Wirusy polio namnażają się
w jelitach, ośrodkowym
układzie nerwowym**



OBJAWY

- ✓ GORĄCZKA
- ✓ BÓL GARDŁA
- ✓ ZMĘCZENIE
- ✓ NUDNOŚCI
- ✓ WYMIOTY
- ✓ SZTYWNOŚĆ KARKU
- ✓ BÓL KOŃCZYN
(uczucie mrowienia lub drętwienia)

PROFILAKTYKA



✓ szczepionka
inaktywowana
zawierająca zabite
wirusy polio,
podawana we
wstrzyknięciu

Nie ma skutecznego leczenia
poliomyelitis

EPIDEMIOLOGIA

ZAKAŻENIE :

- drogą pokarmową (brudne ręce)
- drogą kropelkową

**PO WPROWADZENIU SZCZEPIEŃ OBSERWOWANO SPADEK ZACHOROWAŃ
DZIĘKI SZCZEPIENIOM W POLSCE NIE ODNOTOWANO POLIOMYELITIS OD PONAD 40 LAT**

POWIKŁANIA

- ZAPALENIE OPON MÓZGOWO – RDZENIOWYCH
- NIEDOWŁAD
- PORAŻENIE MIĘŚNI
- NIEWYDOLNOŚĆ ODDECHOWA
- ZGON
- NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ