



PÓŁPASIEC



Herpes zoster



Wirus ospy wietrznej i półpaśca po ospie wietrznej pozostaje w zwojach nerwowych i uaktywnia się w postaci półpaśca



PROFILAKTYKA

SZCZEPIONKA INAKTYWOWANA

- ✓ zawiera białko (glikoproteinę) wirusa
- ✓ zawiera adiuwant (wzmacniający odpowiedź na szczepienie)
- 2 dawki > 90% ochrona przed półpaścem
- ✓ Szczepienia dorosłych o zwiększonym ryzyku zachorowania na półpasiec:
2 dawki
- ✓ Szczepienia dorosłych w wieku >50 lat:
2 dawki

DROGI ZAKAŻENIA

- przy osłabieniu odporności uśpiony wirus reaktywuje się i wywołuje półpaśca
- po przechorowaniu ospy wietrznej wirus do końca życia jest obecny w zwojach nerwowych

OBJAWY

- ✓ SWĘDZĄCA WYSYPKA PĘCHERZYKOWA
- ✓ BÓL W MIEJSCU WYSYPKI

POWIKŁANIA

- półpasiec oczny
- ropne zakażenia skóry
- chroniczny ból
- depresja
- porażenie nerwu twarzowego

POWIKŁANIA PO CHOROBY MOGĄ BYĆ BARDZO NIEBEZPIECZNE!!!



- na półpaśca może zachorować każda osoba, która w przeszłości chorowała na ospę wietrzną
- ryzyko zachorowania wzrasta wraz z wiekiem zwłaszcza u osób z obniżoną odpornością
- można zachorować na półpaśca więcej niż raz